

# Kombinatorika és gráfelmélet 1.

11. gyakorlat, 2024. május 10.

## Síkgráfok

### Tudnivalók:

$G$  síkgráf, ha lerajzolható a síkra metszés nélkül. Tegyük fel, hogy  $G$  le van rajzolva a síkra metszés nélkül,  $n$  csúcs,  $e$  él,  $t$  tartomány,  $k$  összefüggő komponens. **Euler formula:**  $n - e + t = k + 1$ .

Következmény: Ha  $G$  egyszerű,  $n \geq 3$  csúcsú síkgráf, akkor  $e \leq 3n - 6$ . Ha  $G$  egyszerű,  $n \geq 3$  csúcsú páros síkgráf, akkor  $e \leq 2n - 4$ . Sőt, ha  $G$  egyszerű,  $n \geq 3$  csúcsú síkgráf, amelyben nincs háromszög, már akkor is  $e \leq 2n - 4$ .

Következmény következménye:  $K_5$  és  $K_{3,3}$  nem síkgráfok.

**Négyszíntétel** (Appel-Haken 1976) Ha  $G$  síkgráf, akkor  $\chi(G) \leq 4$ . (Ez nem javítható, pl  $K_4$ .)

Topologikus izomorfia. Definiálunk két operációt, amelyek egymás inverzei. 1. operáció: A  $G$  gráf két szomszédos csúcsa legyen  $u$  és  $v$ , töröljük el az  $uv$  élt és vezessünk be egy új  $x$  csúcsot, amelynek két szomszédja van,  $u$  és  $v$ . 2. operáció: Tegyük fel, hogy  $G$ -ben  $x$  foka 2, szomszédai  $u$  és  $v$ . Töröljük el az  $x$  csúcsot és az  $xu$ ,  $xv$  éleket, viszont húzzuk be az  $uv$  élt.

A  $G$  és  $H$  gráfok topologikusan izomorfak, ha az 1. és 2. operáció ismételt alkalmazásával el lehet jutni  $G$ -ből  $H$ -ba.

Észrevétel: Tegyük fel, hogy  $G$  és  $H$  gráfok topologikusan izomorfak. Ekkor  $G$  síkgráf  $\Leftrightarrow H$  síkgráf.

**Kuratovski tétel** (1930)  $G$  akkor és csak akkor síkgráf, ha nem tartalmaz  $K_5$ -tel és  $K_{3,3}$ -mal topologikusan izomorf részgráfot.


**Fáry-Wagner tétel** (1936, 1948) Ha  $G$  síkgráf, akkor lerajzolható metszés nélkül úgy, hogy az élei egyenes szakaszok.

- (i) Egy egyszerű,  $n \geq 3$  csúcsú síkbarajzolt gráfnak pontosan  $3n - 6$  éle van. Bizonyítsuk be, hogy minden tartománya háromszög. (ii) Egy egyszerű,  $n \geq 3$  csúcsú síkbarajzolt gráf minden tartománya háromszög. Bizonyítsuk be, hogy pontosan  $3n - 6$  éle van.


- Hány csúcsa van annak a síkbarajzolható gráfnak, amit 3 háromszög-, 3 négyszög- és egy ötszöglap határol?

*Megoldás:*

- Tetszőleges  $G$  síkbarajzolt gráfra legyen  $n(G)$  a csúcsok,  $e(G)$  az élek,  $t(G)$  a tartományok száma. Határozzuk meg az  $n(G) + e(G) - 2t(G)$  mennyiség maximumát, ha  $G$  bármilyen 100 csúcsú összefüggő egyszerű síkbarajzolt gráf lehet.
- Biz. be: Ha  $G$   $n$  pontú, egyszerű, síkbarajzolható gráf, akkor
  - együttal tóruszra is rajzolható;
  - ha  $G$ -nek  $3n - 6$ -nál kevesebb éle van, akkor behúzható  $G$ -be új él úgy, hogy továbbra is egyszerű, síkbarajzolható gráfot kapjunk;
  - $G$  bármely síkbarajzolásakor ugyanannyi tartomány keletkezik;
  - $G$ -nek vagy van legfeljebb harmadfokú csúcsa vagy  $G$  tetszőleges síkbarajzolásának van háromszöglapja.
- Adjunk meg olyan 8 csúcsú, egyszerű, síkbarajzolható gráfot, aminek a komplementere is síkbarajzolható!
- Mutassuk meg, hogy ha  $|V(G)| \geq 11$ , akkor  $G$  és  $\overline{G}$  egyike biztosan nem síkgráf.
- Egy konvex test minden lapja négyszög vagy nyolcszög és minden pontban pontosan három lap találkozik. Mennyi a négyszög- és nyolcszöglapok számának különbsége?
- Egy mezőn  $k$  ház és  $k$  kút áll. Minden háztól pontosan 4 (különböző) kúthoz vezet út (még hozzá közvetlenül, vagyis más házak vagy kutak érintése nélkül). Mutassuk meg, hogy biztosan van két olyan út, amelyek keresztezik egymást!
- Bizonyítsuk be, hogy minden síkbarajzolt  $G$  gráf 3-összefüggővé tehető további élek behúzásával a síkbarajzoltság megtartása mellett. Igazoljuk, hogy ha  $G$  síkbarajzolt és minden lapja háromszög, akkor  $G$  3-összefüggő.
- Mutassuk meg, hogy ha egy  $G$  egyszerű síkgráfban a legrövidebb kör hossza  $g$ , akkor  $|E(G)| \leq \frac{g}{g-2}(n-2)$ .




1. ábra. Mézga Aladár, Doktor Bubó és Csőrmester lakása és garázsa.



2. ábra. Mézga Aladár, Doktor Bubó és Csőrmester nyaralója.

11. Egy 20-csúcű poliédernek 12 lapja van, mindegyik  $k$  oldalú sokszög. Mennyi a  $k$  értéke?  
 12. Síkbarajzolhatók-e a  $K_6, K_{4,2}, K_{4,3}, K_5 - e, K_{3,3} - e, \overline{C_7}$  gráfok? Hát az alábbiak?



13. Bizonyítsuk be, hogy minden egyszerű síkbarajzolható gráfban  
 a) a minimális fokszám legfeljebb 5;  
 b) ha a minimális fokszám 5, akkor legalább 12 ötödfokú pont van.  
 14. Egy gráfban minden pont foka legfeljebb 3, és minden köre legfeljebb 5 hosszú. Mutassuk meg, hogy a gráf síkgráf!  
 15. Jelölje  $cr(G)$  a  $G$  gráf síkra való lerajzolásakor létrejövő élkeresztezők lehetséges minimális számát. (Feltesszük, hogy három él nem metszheti egymást ugyanabban a pontban.) Mennyi  $cr(K_{4,4})$  értéke? Mennyi  $cr(K_6)$ ?  
 16. Bizonyítsuk be hogy  $cr(K_{5,5}) \geq 11$ .  
 17. Mutassuk meg, hogy a  $K_7$  és a  $K_{4,4}$  gráfok mindegyike tóruszra rajzolható. Bizonyítsuk be, hogy ha  $G$  síkbarajzolt gráf, akkor  $G$ -be tetszőleges élt behúzva tóruszra rajzolható gráfot kapunk.  
 18. Bizonyítsuk be, hogy egy 4-reguláris egyszerű páros gráf nem lehet síkbarajzolható!  
 19. (Hanani-Tutte tétel) (\*) Egy gráfot sikerült úgy lerajzolnunk, hogy bármely két éle páros sokszor metszi egymást. Bizonyítsuk be, hogy síkgráf!  
 20. a (\*). Mézga Aladár (A), Doktor Bubó (B) és Csőrmester (C) egy sorházban laknak, egymás mellett, a garázsaik egy másik épületben vannak, ugyancsak egymás mellett. (1. ábra)  
 Sajnos nagyon rosszban vannak, ezért úgy szeretnék utakat építeni mindhárom lakástól a megfelelő garázsig, hogy az utak ne keresszezzék egymást. (Már öregek és nem tudnak repülni.) Lehetséges ez?

b. Ráadásul a nyaralók is egy közös kertben vannak, de mindenkinek saját kapuja van, a 2. ábra szerint. Nem túl szerencsés elrendezés. Itt meg tudják építeni az utakat a három háztól a megfelelő kapukig úgy, hogy ne keresztezzék egymást?

21. Mutassuk meg, hogy ha a  $G$  síkbarajzolt gráf minden lapját páros számú él határolja, akkor  $G$  páros gráf.
22. Tetszőleges  $G$  síkbarajzolt gráfra legyen  $n(G)$  a csúcsok,  $e(G)$  az élek,  $t(G)$  a tartományok száma. Határozzuk meg az  $n(G) + 2e(G) - t(G)$  mennyiség maximumát, ha  $G$  bármilyen 2020 csúcsú egyszerű összefüggő síkbarajzolt gráf lehet.

#### Házi feladat.

1. Legyen  $G$  három síkgráf uniója. Bizonyítsuk be, hogy  $\chi(G) \leq 18$ .

2. Az Operatív Törzs szakszerűen feltérképezte az emberek kapcsolati hálóját és a kapott 10000000 csúcsú gráfot sikerült összesen két él-metszéssel felrajzolni a VIP Oltóponton található Operatív Digitális Táblára.

Bizonyítsuk be, hogy az emberek egy részét (nem 0-t és nem is az összeset) karanténba tudják zárni úgy, hogy legfeljebb 5 kapcsolatot kell hatóságilag megszakítani!

### Nyakunkon a ZH!!

#### Kombinatorika és gráfelmélet I

## 2. pótpótZH, 2022. május 24, 8.15-9.45, IE 217-1

A rendelkezésre álló munkaidő 90 perc. Minden résztvevő a **nevét**, **NEPTUN kódját** a dolgozat *minden* lapjának jobb felső sarkában *olvashatóan* és *helyesen* tüntesse fel. Minden egyes feladat helyes megoldása 10 pontot ér. A dolgozatok értékelése (tájékoztató jelleggel): 0-23 pont: 1, 24-32 pont: 2, 33-41 pont: 3, 42-50 pont: 4, 51-60 pont: 5. A puszta (indoklás nélküli) eredményközlést nem értékeljük. A megindokolt részeredményért arányos pontszám jár. Írószereken és papírokon kívül semmilyen segédeszköz használata sem megengedett, így tilos az írott vagy nyomtatott jegyzet, a számoló- és számítógép, mobiltelefon, tévé és rádió használata, továbbá a dolgozatírás közben történő együttlátás.

1. A  $G$  gráf csúcsai  $v_1, \dots, v_{60}$ . A  $v_i$  és  $v_j$  csúcsok ( $i \neq j$ ) akkor és csak akkor vannak összekötve, ha  $i - j - 1$  vagy  $j - i - 1$  osztható 5-tel.

Határozzuk meg  $\alpha(G)$ -t.

2. A  $G$  100 csúcsú gráfban nincs izolált pont,  $\rho(G) = 60$ . Bizonyítsuk be, hogy  $\alpha(G) \geq 9$ .

3.  $G$  ismét egy 100 csúcsú gráf. Bizonyítsuk be, hogy  $\chi(G) + \chi(\overline{G}) \geq 20$ . ( $\overline{G}$  a  $G$  komplementer gráfja)

4.  $G$  a királygráf, vagyis  $G$  csúcsai megfelelnek a 8-szor 8-as sakktábla mezőinek, két csúcs akkor és csak akkor van összekötve, ha a megfelelő mezők király lépésre vannak egymástól.

a. Határozzuk meg  $\chi'(G)$ -t.

b. Adjuk meg  $G$  éleinek egy színezését  $\chi'(G)$  színnel.

5. A  $G$  100 csúcsú síkgráf. Bizonyítsuk be, hogy  $\tau(G) \leq 75$ .

6. A  $G$  egyszerű síkbarajzolt gráfnak 3 háromszög, 4 négyszög és 5 ötszög tartománya van, beleértve a végtelen tartományt is, és más tartománya nincs.

Hány csúcsa van?