

## Kombinatorika és gráfelmélet 2.

11. gyakorlat, 2013. április 23.

### Hipergráfok

1. a. Egy fának legfeljebb hány *összefüggő* részgráfját választhatjuk ki úgy, hogy egyik kiválasztott részgráf se legyen részgráfja egy másik kiválasztott részgráfnak? b. Egy fának legfeljebb hány *feszített* részgráfját választhatjuk ki úgy, hogy egyik kiválasztott részgráf se legyen részgráfja egy másik kiválasztott részgráfnak?
2. Legyen  $\mathcal{F}$  Egy olyan halmazrendszer, ami nem tartalmaz  $s + 1$  hosszú láncot (azaz  $A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_{s+1}$  halmazokat). Bizonyítsuk be, hogy  $\sum_{k=0}^n \frac{f_k}{\binom{n}{k}} \leq s$ , ahol  $f_k$  a  $k$  méretű halmazok számát jelöli.
3. Legyen  $\mathcal{F} \subseteq 2^{[2n]}$  olyan metsző halmazrendszer, amely minden tagjának páros az elemszáma. Mutassuk meg, hogy  $\mathcal{F}$ -nek legfeljebb  $2^{2n-2}$  tagja lehet.
4. Tegyük fel, hogy a  $\mathcal{H} = (V, \mathcal{E})$  hipergráfnak bármely két éle diszjunkt vagy az egyik tartalmazza a másikat. Legfeljebb hány éle lehet  $\mathcal{H}$ -nak?
5. Legfeljebb hány klubot alapíthat MOD-3-FALVA  $n$  lakója? Ha  $A_i$  jelöli az  $i$ -dik klub tagságát, akkor  $|A_i| \not\equiv 0 \pmod{3}$  és minden  $i \neq j$ -re  $|A_i \cap A_j| \equiv 0 \pmod{3}$ . (\*)
6. Tegyük fel, hogy a  $\mathcal{H} = (V, \mathcal{E})$  hipergráf nem tartalmaz kört, azaz nincs olyan páronként különböző csúcsokból és hiperélekből álló  $x_1, E_1, x_2, E_2, \dots, x_k, E_k, x_{k+1} = x_1$  sorozat, ahol az  $E_i$  él tartalmazza az  $x_i$  és  $x_{i+1}$  csúcsokat. Mutassuk meg, hogy ha  $\emptyset$  nem éle  $\mathcal{H}$ -nak és  $\mathcal{H}$  összefüggő is (azaz  $V$  nem állítható elő két diszjunkt nemüres  $V_1$  és  $V_2$  halmaz uniójaként úgy, hogy minden hiperél valamelyik  $V_i$  halmaz része), akkor igaz, hogy  $\sum\{|E| - 1 : E \in \mathcal{E}\} = |V| - 1$ .
7. Mutassuk meg, hogy ha az  $\mathcal{F} \subseteq 2^{[n]}$  halmazrendszernek  $2^{n-1}$  tagja van és ezek közül semelyik kettő sem diszjunkt, akkor léteznek  $F_1, F_2 \in \mathcal{F}$  olyan tagjai a rendszernek, amiknek pontosan egy közös elemük van.
8. Mutassunk olyan  $\mathcal{F} \subseteq 2^{[n]}$  halmazrendszert, hogy  $\mathcal{F}$  bármely két tagjának metszete legalább két elemet tartalmaz és  $|\mathcal{F}| = 2^{n-2}$ ? Létezik-e ennél nagyobb halmazrendszer a fenti tulajdonsággal? Hasznos igazság:  $\binom{2k}{k} \leq 2^{2k-1}$ . (Sőt,  $\leq 2^{2k}/\sqrt{k}$  ha  $k$  elég nagy.)
9. Tegyük fel, hogy  $k < n/2$  és  $\mathcal{F} \subseteq \binom{[n]}{k}$  olyan metsző halmazrendszer, amire  $|\mathcal{F}| = \binom{n-1}{k-1}$ . Mutassuk meg, hogy  $[n]$ -nek van olyan  $i$  eleme, amit  $\mathcal{F}$  minden tagja tartalmaz. (Az Erdős-Ko-Rado tétel egyenlőség esete.)

### Régi zárthelyi feladatok

1. Mutassuk meg, hogy  $R(\underbrace{3, 3, \dots, 3}_k) \leq k!(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{k!}) + 1$ .
2. Tegyük fel, hogy a gömbön úgy adott 12, egymástól nem feltétlenül különböző pont, hogy azokból legalább 49 különböző egység távolságra lévő pontpár választható ki. Igazoljuk, hogy a gömb sugara kisebb 1-nél.
3. Legfeljebb hány vektort tartalmazhat az  $X \subseteq \{0, 1\}^n$  halmaz, ha tetszőleges  $\underline{u}, \underline{v} \in X$  vektorokra létezik olyan  $i \in [n]$  koordináta, amire  $\underline{u}_i = 1$  és  $\underline{v}_i = 0$ ?