

## Kombinatorika és gráfelmélet 2.

7. gyakorlat, 2015. március 24.

### Ramsey elmélet folytatás

Ramsey tétel (gráfokra, két színnel): Minden  $k, l > 0$  számokhoz van olyan (legkisebb)  $R = R(k, l)$  szám, amelyre igaz, hogy az  $R$  csúcsú teljes gráf éleit tetszőlegesen kiszínezve pirossal és kézzel, vagy van egy  $k$  csúcsú teljes részgráf, amelynek minden éle piros, vagy egy  $l$  csúcsú, amelynek minden éle kék. Erdős–Szekeres:  $R(k, l) \leq \binom{k+l-2}{k-1}$ .

Ramsey tétel (gráfokra,  $r$  színnel): Minden  $r > 0$ ,  $k_1, k_2, \dots, k_r > 0$  számokhoz van olyan (legkisebb)  $R = R(k_1, k_2, \dots, k_r)$  szám, amelyre igaz, hogy az  $R$  csúcsú teljes gráf éleit tetszőlegesen kiszínezve az  $1, 2, \dots, r$  színekkel, valamilyen  $1 \leq i \leq r$  számra vagy van egy  $k_i$  csúcsú teljes részgráf, amelynek minden éle  $i$  színű.

Ramsey tétel ( $k$ -uniform hipergráfokra,  $r$  színnel): Minden  $r > 0$ ,  $k \geq 2$ ,  $k_1, k_2, \dots, k_r > 0$  számokhoz van olyan (legkisebb)  $R = R_k(k_1, k_2, \dots, k_r)$  szám, amelyre igaz, hogy az  $R$  csúcsú teljes  $k$ -uniform hipergráf éleit tetszőlegesen kiszínezve az  $1, 2, \dots, r$  színekkel, valamilyen  $1 \leq i \leq r$  számra vagy van egy  $k_i$  csúcsú teljes rész-hipergráf, amelynek minden éle ( $k$ -asa)  $i$  színű.

Schur tétel: Minden  $t > 0$ -ra létezik olyan  $N = N(t)$  szám, amelyre teljesül, hogy akárhogyan színezzük ki az  $1, 2, \dots, N$  számokat  $t$  színnel, mindig lesznek olyan  $x, y, z$  egyszínű számok, amelyekre  $x + y = z$ .

Van der Waerden tétel: Minden  $t, k > 0$ -ra létezik olyan  $N = N(t, k)$  szám, amelyre teljesül, hogy akárhogyan színezzük ki az  $1, 2, \dots, N$  számokat  $t$  színnel, mindig lesz egy  $k$  tagú számtani sorozat, amelynek a tagjai egyszínűek.

1. Igazoljuk, hogy  $R_3(4, 4) \leq 21$ .
2. Igazoljuk a következő egyenlőtlenséget:  $R_3(k, l) \leq R_2(R_3(k-1, l), R_3(k, l-1)) + 1$ . Ez (nagyságrendileg) milyen felső korlátot ad  $R_3(k, k)$ -ra?
3. Igazoljuk, hogy  $c \geq 3$  esetén  $R_t(n_1, n_2, \dots, n_c) \leq R_t(n_1, n_2, \dots, n_{c-2}, R_t(n_{c-1}, n_c))$  teljesül.
4. Tegyük fel, hogy tudjuk, hogy a Van der Waerden tétel igaz 2 szín felhasználásával, mutassuk meg ebből, hogy igaz 3 színnel is, sőt több színnel is.
5. Mutassuk meg, hogy minden  $k$  pozitív egészhez létezik olyan  $N(k)$  küszöb, hogy ha  $n > N(k)$  és az  $[n] := \{1, 2, \dots, n\}$  halmaz részhalmazait  $k$  színnel színezzük, akkor léteznek az  $[n]$  halmaznak olyan diszjunkt  $X_1$  és  $X_2$  részhalmazai, hogy  $X_1, X_2$  és  $X_1 \cup X_2$  színe megegyezik. Igaz-e az állítás, három diszjunkt részhalmazra?
6. Legyen  $H(V, E)$  egy  $k$ -uniform hipergráf, amelynek kevesebb mint  $2^{k-1}$  éle van. Bizonyítsuk be, hogy  $H$  csúcsai kiszínezhetők pirossal és kézzel úgy, hogy semelyik él sem egyszínű.
7. (Végtelen Ramsey tétel) Egy végtelen sok csúcsú teljes gráf éleit kiszíneztük két színnel. Bizonyítsuk be, hogy van egy végtelen sok csúcsú teljes részgráf, amelynek minden éle ugyanolyan színű.
8. Mutassuk meg, hogy ha  $G$   $n$  csúcsú, egyszerű gráf, akkor  $\max(\alpha(G), \omega(G)) \geq 1 + \log_4 n$ .
9. Tegyük fel, hogy a sík pontjait kiszínezte valaki pirosra és zöldre úgy, hogy mindkét színt használta. Mutassuk meg, hogy mindenképpen keletkezett egymástól egységnyi távolságban levő pontpár, melynek egyik tagja piros, a másik zöld! Igaz-e, hogy a sík ilyen kiszínezésekor biztosan található olyan egységoldalú szabályos háromszög, aminek csúcsai egyszínűek?
10. (Múlt heti házi feladat) Tegyük fel, hogy a sík pontjait kiszínezte valaki pirosra és zöldre úgy, hogy nincs két zöld pont egymástól egységtávolságra. Legyen  $T$  egy tetszőleges háromszög. Bizonyítsuk be, hogy van egy  $T$ -vel egybevágó háromszög, amelynek mind a három csúcsa piros.
11. Legyen  $a_n$  a természetes számok tetszőleges szigorúan növvő végtelen sorozata. Mutassuk meg, hogy található akármilyen hosszú részsorozat, amelyben bármely két elem relatív prím, vagy semelyik két elem sem relatív prím.
12. Kiszínezhetők-e az egész számok két színnel úgy, hogy ne létezzon egyszínű végtelen számtani sorozat? Hát mértani?
13. Mutassunk olyan  $(k-1)^2$  pontú gráfot, amelyben nincs sem teljes  $k$ -as sem üres  $k$ -as!
14.  $P$  egy olyan síkbeli ponthalmaz, amelyben bármely két pont közötti távolság elgész és nincs az összes pont egy egyenesen. Bizonyítsuk be, hogy  $P$  véges sok pontból áll.

#### Házi feladat

1. Döntsük el, hogy igaz-e a következő állítás. Minden  $n \geq 1$ -hez van olyan  $N$ , hogy akárhogyan színezzük ki az  $N$  elemű halmaz összes részhalmazát két színnel, található olyan  $n$  elemű részhalmaz, amelynek az összes részhalmaza ugyanolyan színű.
2. Bizonyítsuk be, hogy minden  $n$ -hez létezik olyan  $K(n)$ , hogy tetszőleges  $K(n)$  különböző pont a síkon legalább  $n$  különböző távolságot határoz meg.